

**DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL ÎNTRE  
TROMBOFLEBITĂ PROFUNDĂ ȘI CHISTUL BAKER  
FUZAT GAMBIEI. EVALUARE ECOGRAFICĂ**

Dr. **Săvescu Domnica**<sup>1</sup>, as.univ.dr. **Necula Radu**<sup>2</sup>,

dr. **Oțelea Carmen**<sup>1</sup>,

prof.univ.dr. **Șamotă Iosif**<sup>2</sup>, stud. **Bălan Diana**<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Spitalul Clinic județean de urgență Brașov

<sup>2</sup> Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania Brașov

*The authors present the case of a 56 year-old patient, hospitalized in Emergency County Hospital Brașov in order to be treated for a tumor-like in the popliteal fosa accompanied with an important swelling.*

*The tumor-like appearance has been previously diagnosed as a profound thrombophlebitis in another medical unit. Further investigations have invalidated the first diagnose and confirmed that of a Baker's cyst with a shank extension.*

*In this presentation we want to reveal the importance of imagistic investigation for the differential diagnosis between VPT and a Baker's cyst with a shank extension, for choosing the right treatment.*